

Bijlage 1: Informatie over geneesmiddelinteracties en voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Farmacodynamische interacties

Geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze het QT-interval verlengen / dat ze mogelijk hartritmestoornissen veroorzaken

Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van hydroxychloroquine bij patiënten die geneesmiddelen krijgen waarvan bekend is dat ze het QT-interval verlengen, bijv. klasse IA- en III-antiarritmica, tricyclische antidepressiva, antipsychotica en sommige anti-infectiemiddelen, als gevolg van een verhoogd risico op ventriculaire aritmie (zie de rubrieken “Waarschuwingen” en “Overdosering” in de SKP). Halofantrine mag niet samen met hydroxychloroquine worden toegediend.

Antidiabetica

Aangezien hydroxychloroquine de effecten van een hypoglycemiserende behandeling kan versterken, kan het nodig zijn om de dosissen van insuline of van de antidiabetica te verlagen.

Anti-malaria geneesmiddelen

Samen toedienen van hydroxychloroquine met andere anti-malaria geneesmiddelen die de convulsiedrempel verlagen (vb. mefloquine) kunnen het risico op convulsies verhogen.

Anti-epileptica

De activiteit van anti-epileptica kan verminderd zijn wanneer samen toegediend met hydroxychloroquine.

Andere

Er bestaat een theoretisch risico op inhibitie van de intra-cellulaire α -galactosidase activiteit wanneer hydroxychloroquine samen met agalsidase wordt toegediend.

Farmacokinetische interacties

Effecten van andere geneesmiddelen op hydroxychloroquine:

Antacida

Zoals met chloroquine, kunnen antacida de absorptie van hydroxychloroquine verminderen en dus wordt een interval van 4 uur aangeraden tussen de inname van hydroxychloroquine en antacida.

Effecten van hydroxychloroquine op andere geneesmiddelen:

Ciclosporine

Er werden verhoogde ciclosporine plasmaspiegels gerapporteerd wanneer ciclosporine ne hydroxychloroquine samen werden toegediend.

Digoxine

De gelijktijdige toediening van hydroxychloroquine en digoxine kan aanleiding geven tot een stijging van de serumspiegels van digoxine: bij patiënten die deze beide geneesmiddelen tegelijkertijd krijgen, moet men dus zorgvuldig de serumspiegels van digoxine controleren.

Ter informatie, een update van sectie 4.5 van de samenvatting van de kenmerken van het product (SKP) van Plaquenil wordt momenteel herzien als onderdeel van een worksharing-variatie (op Europees niveau).